

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

【用法・用量】一部変更のお知らせ

2013年12月

処方せん医薬品：注意—医師等の処方せんにより使用すること

HMG-CoA 還元酵素阻害剤

ピタバスタチンCa錠1mg「EE」

ピタバスタチンCa錠2mg「EE」

ピタバスタチンCa錠4mg「EE」

<ピタバスタチンカルシウム錠>

製造販売元  エルメッド エーザイ株式会社
東京都豊島区東池袋3-23-5

販売提携  エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

このたび、標記製品の「用法・用量」の医薬品製造販売承認事項一部変更承認（2013年11月21日付）を取得いたしました。それに伴い、「用法・用量」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。

今回の改訂により、先発品（診療報酬上の先発・代表薬剤）と「用法・用量」が同一となりました。

今後の弊社製品のご使用に際しましては、本書を適正使用情報としてご活用いただきますようお願い申し上げます。禁忌、原則禁忌を含む使用上の注意等については、弊社ホームページ（<http://www.emec.co.jp>）及び医薬品医療機器情報提供ホームページ（<http://www.info.pmda.go.jp>）に掲載されている最新の添付文書をご確認ください。

なお、製品に関するお問合せにつきましては、弊社医薬情報担当者または商品情報センター（フリーダイヤル：0120-223-698、平日9:00～17:00）までご連絡ください。

[改訂箇所及び改訂理由（項目別）]

1. 用法・用量

<改訂部分抜粋>

下線部分を改訂いたしました（ 部分を削除）。

改訂後	改訂前
通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1～2mgを1日1回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。	通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1～2mgを1日1回 <u>夕食後に</u> 経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。

改訂理由

医薬品製造販売承認事項一部変更承認により、「用法・用量」を改訂いたしました。
今回の改訂により、先発品（診療報酬上の先発・代表薬剤）と「用法・用量」が同一となりました。