

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

使用上の注意改訂のお知らせ

処方せん医薬品：注意－医師等の処方せんにより使用すること
利尿降圧剤

2010年6月

フロセミド細粒4%「EMEC」

<フロセミド細粒>

製造販売元



エルメッド エーザイ株式会社
東京都豊島区東池袋3-23-5

販売提携



エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

このたび、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。
なお、DSU（医薬品安全対策情報）には、No.190へ掲載の予定です。

今後の弊社製品のご使用に際しましては、本書を適正使用情報としてご活用いただきますようお願い申し上げます。なお、製品に関するお問合せにつきましては、弊社医薬情報担当者または商品情報センター（フリーダイヤル：0120-223-698、平日9:00～17:00）までご連絡ください。

[改訂箇所及び改訂理由（項目別）]

1. 相互作用

<改訂部分抜粋>

下線部分を追加いたしました。

改訂後			改訂前		
3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）			3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(省略)			(省略)		
<u>V₂-受容体拮抗剤</u> モザバプタン 塩酸塩	利尿作用が増強するおそれがある。 血圧、脈拍数、尿量、血清ナトリウム濃度等を頻回にチェックし、脱水症状の発現に注意すること。	利尿作用を増強させる。			

改訂理由

自主改訂により、「併用注意」の項を改訂いたしました。

2. 副作用

<改訂部分抜粋>

下線部分を改訂いたしました。

改訂後	改訂前
4. 副作用 (1) 重大な副作用（頻度不明） 5) <u>中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）</u> 、 <u>皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）</u> 、 <u>多形紅斑</u> 中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。	4. 副作用 (1) 重大な副作用（頻度不明） 5) 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）皮膚粘膜眼症候群があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

改訂理由

平成22年6月1日付 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知 薬食安発0601第1号に基づき、「重大な副作用」の項を改訂いたしました。