

日医工のエチゾラム錠 を服用される方へ

このお薬は**不安や緊張をやわらげたり、
筋肉の緊張をとる**作用があります。

服用する前に必ずお読みください

このお薬は、**漫然と長期に服用を続けると、お薬がないと
いられなくなったり、お薬を中止すると手足がふるえて不眠・
不安・けいれんなどが起きたりすることがあります。**
必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。

飲み方について

- 1.睡眠障害で服用される場合は、寝る支度を
すませてから、**寝る直前に服用してください。**
- 2.自己判断で服用を中止したり、お薬の量を
増やしたりしないでください。
- 3.飲み忘れに気づいても、**決して2回分を一度に服用しないで
ください。**
- 4.誤って多く服用した場合は、医師または薬剤師に連絡して
ください。



服用中の注意点

- アルコール飲料は控えてください。**このお薬
に影響します。
- 翌朝以降に眠気が残ったり、注意や集中する
ことができなくなったりすることがあるので、
**自動車の運転など危険を伴う機械の操作は
しないでください。**
- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。
他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する
場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または
薬剤師に伝えてください。**



副作用について

- 次の症状に気づいたら、**すぐに医師または薬剤師に連絡して
ください。**

息苦しい、体がだるい、38℃以上の発熱、
考えがまとまらない、尿が赤褐色になる



この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことが
ある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管
してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり
渡したりしないでください。

日医工のエチゾラム錠 を服用される方へ

このお薬は**不安や緊張をやわらげたり、
筋肉の緊張をとる**作用があります。

服用する前に必ずお読みください

このお薬は、**漫然と長期に服用を続けると、お薬がないと
いられなくなったり、お薬を中止すると手足がふるえて不眠・
不安・けいれんなどが起きたりすることがあります。**
必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。

飲み方について

- 1.睡眠障害で服用される場合は、寝る支度を
すませてから、**寝る直前に服用してください。**
- 2.自己判断で服用を中止したり、お薬の量を
増やしたりしないでください。
- 3.飲み忘れに気づいても、**決して2回分を一度に服用しないで
ください。**
- 4.誤って多く服用した場合は、医師または薬剤師に連絡して
ください。



服用中の注意点

- アルコール飲料は控えてください。**このお薬
に影響します。
- 翌朝以降に眠気が残ったり、注意や集中する
ことができなくなったりすることがあるので、
**自動車の運転など危険を伴う機械の操作は
しないでください。**
- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。
他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する
場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または
薬剤師に伝えてください。**



副作用について

- 次の症状に気づいたら、**すぐに医師または薬剤師に連絡して
ください。**

息苦しい、体がだるい、38℃以上の発熱、
考えがまとまらない、尿が赤褐色になる



この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことが
ある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管
してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり
渡したりしないでください。