

ナフトピジル錠/OD錠「日医工」 ナフトピジル錠/OD錠「EE」 を服用される方へ

このお薬は前立腺肥大に伴う排尿障害を改善するお薬です。



服用する前に

次の方は服用前に必ず医師または薬剤師に伝えてください。

- 以前にお薬を服用して、かゆみや発疹などのアレルギー症状が出たことのある方
- 肝臓、心臓に病気のある方、脳血管障害のある方
- 他にお薬を服用している方

服用に関する注意点


- OD錠は水なしでも服用することができる口腔内崩壊錠です。舌の上でだ液を含ませ舌で軽くつぶし、だ液と一緒に服用することができます。また、普通のお薬と同じように水またはぬるま湯で服用することも可能です。
- 医師の指示なしに、ご自身の判断で服用を中止したり、お薬の量を変えたりしないでください。

- 飲み忘れた場合は、1回とばして、次の(翌日の)通常の服用時間に1回分を服用してください。絶対に2回分を一度に服用しないでください。
- めまい、立ちくらみなどがあらわれることがありますので、高い所での作業や自動車の運転など危険を伴う作業には十分注意してください。
- 白内障の手術を受ける場合には、このお薬を服用していることを眼科の医師に伝えてください。
- 他の病院を受診する場合は、このお薬を服用していることを医師に伝えてください。

このお薬の服用中に下記のような症状に気づいた場合には、すぐに医師または薬剤師に相談してください。



身体がだるい



食欲がない



皮膚や白目が
黄色くなる



気を失う、
意識がなくなる

これらの症状以外でも気になることがあれば医師または薬剤師に相談してください。

保管等に関する注意点

- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人(親、兄弟、友人など)に絶対に渡さないでください。
- 光と高温多湿を避けて保管してください。(光により変色することがあります。変色したものは服用しないでください。)
- 子供の手の届かない場所に保管してください。