

ブロチゾラム錠「EMEC」 を服用される方へ

このお薬は**不眠症のお薬**です。

▶服用する前に必ずお読みください

このお薬は、**漫然と長期に服用を続けると、お薬をたくさん飲みたい、お薬がないといられない気持ちになることがあります。**また、お薬を中止すると、不眠や不安などの症状があらわれることがあります。

必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。

▶飲み方について

- 寝る支度をすませてから、**寝る直前に服用してください。**
- **いったん寝たあと、短時間後にまた起きて仕事などをする必要があるときは飲まないでください。**
- 自己判断でお薬の服用を中止したり、お薬の量を増やしたりしないでください。
- 飲み忘れに気づいても、**決して2回分を一度に服用しないでください。**
- 誤って多くを服用した場合は、医師または薬剤師に相談してください。



▶服用中の注意点

- **アルコール飲料は控えてください。**このお薬に影響します。
- 翌朝以降に眠気が残ったり、注意や集中することができなくなったりすることがあるので、**自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。**
- このお薬には一緒に服用する時に注意すべきお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

▶副作用について

次の症状に気づいたら、**すぐに医師または薬剤師に連絡してください。**

皮膚や白目が黄色くなる、
物忘れ、もうろう感、息苦しい



この他にも気になる症状があらわれた場合や、わからないことがある場合には、**医師または薬剤師に相談してください。**

▶保管等に関する注意点

- 光・高温多湿を避け、子どもの手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。

ブロチゾラム錠「EMEC」 を服用される方へ

このお薬は**不眠症のお薬**です。

▶服用する前に必ずお読みください

このお薬は、**漫然と長期に服用を続けると、お薬をたくさん飲みたい、お薬がないといられない気持ちになることがあります。**また、お薬を中止すると、不眠や不安などの症状があらわれることがあります。

必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。

▶飲み方について

- 寝る支度をすませてから、**寝る直前に服用してください。**
- **いったん寝たあと、短時間後にまた起きて仕事などをする必要があるときは飲まないでください。**
- 自己判断でお薬の服用を中止したり、お薬の量を増やしたりしないでください。
- 飲み忘れに気づいても、**決して2回分を一度に服用しないでください。**
- 誤って多くを服用した場合は、医師または薬剤師に相談してください。



▶服用中の注意点

- **アルコール飲料は控えてください。**このお薬に影響します。
- 翌朝以降に眠気が残ったり、注意や集中することができなくなったりすることがあるので、**自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。**
- このお薬には一緒に服用する時に注意すべきお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

▶副作用について

次の症状に気づいたら、**すぐに医師または薬剤師に連絡してください。**

皮膚や白目が黄色くなる、
物忘れ、もうろう感、息苦しい



この他にも気になる症状があらわれた場合や、わからないことがある場合には、**医師または薬剤師に相談してください。**

▶保管等に関する注意点

- 光・高温多湿を避け、子どもの手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。