

「効能・効果」及び「用法・用量」の追加のお知らせ

免疫抑制剤

劇薬,  
処方せん医薬品

シクポラールカプセル 10

劇薬,  
処方せん医薬品

シクポラールカプセル 25

劇薬,  
処方せん医薬品

シクポラールカプセル 50

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社  
富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さてこの度、標記製品につきまして、平成 23 年 9 月 9 日付で「効能・効果」及び「用法・用量」が追加になりました。それに伴い、下記のとおり、「効能・効果」及び「用法・用量」を変更致しますので、お知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

敬白

新旧対照表 ( \_\_\_\_\_ : 追加箇所)

	改 訂 後	現 行
効 能 ・ 効 果	1. 下記の臓器移植における拒絶反応の抑制 腎移植, 肝移植, <u>心移植, 肺移植, 膵移植</u> 2. ~ 7. (現行どおり)	1. 下記の臓器移植における拒絶反応の抑制 腎移植, 肝移植 2. ~ 7. (略)
用 法 ・ 用 量	1. ~ 2. (現行どおり) 3. <u>心移植, 肺移植, 膵移植の場合</u> <u>通常, 移植 1 日前からシクロスポリンとし</u> <u>て 1 日量 10~15mg/kg を 1 日 2 回に分け</u> <u>て経口投与する。以後徐々に減量し, 維持</u> <u>量は 1 日量 2~6mg/kg を標準とするが,</u> <u>症状により適宜増減する。</u> 4. ~ 9. (項番号の変更のみ)	1. ~ 2. (略) ←記載なし 3. ~ 8. (略)

