

# 効能・効果及び用法・用量の追加のご案内

## オランザピン錠 2.5mg/5mg/10mg 「日医工」

## オランザピン OD 錠 5mg/10mg 「日医工」

## オランザピン細粒 1% 「日医工」

医療関係者 各位

謹 啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2016年6月に追補収載を予定しております『オランザピン錠2.5mg/5mg/10mg 「日医工」』『オランザピンOD錠5mg/10mg 「日医工」』『オランザピン細粒1% 「日医工」』の効能・効果、用法・用量の追加が6月1日に承認されましたので、ご案内申し上げます。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹 白

記

### 【効能・効果】

統合失調症

双極性障害における躁症状及びうつ症状の改善

(下線部追加)

### 【用法・用量】

統合失調症：

通常、成人にはオランザピンとして5～10mgを1日1回経口投与により開始する。維持量として1日1回10mg経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、1日量は20mgを超えないこと。

双極性障害における躁症状の改善：

通常、成人にはオランザピンとして10mgを1日1回経口投与により開始する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は20mgを超えないこと。

双極性障害におけるうつ症状の改善：

通常、成人にはオランザピンとして5mgを1日1回経口投与により開始し、その後1日1回10mgに増量する。なお、いずれも就寝前に投与することとし、年齢、症状に応じ適宜増減するが、1日量は20mgを超えないこと。

(下線部追加)

以上

File No.20160610c11