

本資料は“先発品と後発品で適応症の異なる薬剤”を「医薬品医療機器情報提供ホームページ」などを参考にして日医工MPSがまとめました。適応症名は一部省略しているものもあります。また調査漏れ、資料作成後の承認状況等により記載情報が変更になっている可能性もあります。本資料はチェック用の参考資料としてご利用いただき、必ず最新の添付文書等でご確認ください。  
**[作成日:2009年7月10日]**

<b>分類</b> :先発品のみ備考欄の「適応症」を有している医薬品	日医工品には適応症が有るもの
<b>分類</b> :先発品と一部の後発品が備考欄の「適応症」を有している医薬品	日医工品には適応症が無いもの
<b>分類</b> :一部の後発品には備考欄の「適応症」を有しているが、先発品にはない医薬品	日医工には該当品が無いもの

一般名(あ順)	液	分類	先発品名	備考欄(適応症・用法等)	日医工品名	
アクリノール水和物	液		アクリノール消毒用液0.1% 「マルイシ」	口腔領域における化膿局所の消毒	アクリノール液0.1%「ORY」	無
アシクロビル	ゼリー		ゾビラックス(錠400)	単純疱疹、骨髄移植における単純ヘルペスウイルス感染症(単純疱疹)の発症抑制(ゼリー剤)	アシビル内服ゼリー800mg	無
アスピリン	末		(アスピリン「ホエイ」)	川崎病(川崎病による心血管後遺症を含む)	アスピリン・OY	無
アズレンスルホン酸ナトリウム	細粒		アズノール	[内服用の細粒・顆粒のみ]含嗽(咽頭炎、扁桃炎、口内炎、急性歯肉炎、舌炎、口腔創傷)	(該当品なし)	
アムロジピンベシル酸塩	錠		ノルバスク、アムロジン	[用法]効果不十分な場合には1日1回10mgまで増量することができる	アムロジピン錠2.5mg・5mg	無
アモキシシリン	Cp		サワシリン、パセトシン	「胃潰瘍・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症」のうち ・アモキシシリン水和物、クラリスロマイシン及びラベプラゾールナトリウム併用の場合 ・アモキシシリン水和物、クラリスロマイシン及びプロトンポンプインヒビター併用によるヘリコバクター・ピロリの除菌治療が不成功の場合	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	無
アルガトロバン	注		スロンノン、ノバスタン	ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)型における血栓症の発症抑制	アルガロン注10mg	無
アルプロスタジル	注		パルクス、リプル	経上腸間膜動脈性門脈造影における造影能の改善	(該当品なし)	
アルベカシン硫酸塩	注用		ハベカシン	先発品には1日1回の用法がある(後発品は1日2回) [用法]成人にはアルベカシン硫酸塩として、1日1回150~200mg(力価)を30分~2時間かけて点滴静注する [小児][用法]小児にはアルベカシン硫酸塩として、1日1回4~6mg(力価)/kgを30分かけて点滴静注する	(該当品なし)	
イオバミドール(注のみ)	注		イオバミロン	用法のただし書、「なお、胸・腹部を高速らせんコンピューター断層撮影で撮像する場合は、撮影対象部位により静脈内投与速度を調節する。ただし、投与量は肝臓領域を除く胸・腹部の場合は100mLまでとするが、肝臓領域の場合は150mLまで投与することができる。」(後発品ではイオバロミンにあり)	モイオバミン注300、370	無
イトラコナゾール	Cp・錠		イトリゾール	爪カンジダ症、カンジダ性爪囲爪炎	イトラコナカプセル50、トラコナ錠50mg・100mg	無
	Cp		イトリゾール	[用法]イトラコナゾール注射剤からの切り替えの場合、1回200mgを1日2回(1日用量400mg)食直後に経口投与する	イトラコナカプセル50 トラコナ錠50mg・100mg	有 無
イミダプリル塩酸塩	錠		タナトリル	1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg・5mg「日医工」、「TCK」	無
ウルソデオキシコール酸	錠		ウルソ	原発性胆汁性肝硬変における肝機能の改善	ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」	無
	錠		ウルソ	C型慢性肝炎における肝機能の改善(後発品ではウピロン錠100mgにあり)		

一般名(あ順)		分類	先発品名	備考欄(適応症・用法等)	日医工品名	
オメプラゾール(錠)	10mg		オメプラール、オメプラゾン	非びらん性胃食道逆流症、胃潰瘍又は十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助	オメラップ錠10	有
	20mg			胃潰瘍又は十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助	オメラップ錠20	有
過テクネチウム酸ナトリウム			ウルトラテクネカウ	医療機器「テクネガス発生装置」との組合せ使用による局所肺換気機能の検査	(該当品なし)	
カルベジロール	錠		アーチスト	「虚血性心疾患または拡張型心筋症に基づく慢性心不全」でACE阻害薬、利尿剤、ジギタリス等の基礎治療を受けている患者	カルベジロール錠10「タツミ」	無
グラニセトロン塩酸塩	注		カイトリル	造血幹細胞移植前処置時の放射線全身照射(TBI)に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)	グラニセトロン静注液1mg・3mg「日医工」、グラニセトロン点滴静注液3mg バック「日医工」	無
クラリスロマイシン(50mg錠、DS)	錠・DS		クラリス、クラリシッド	後天性免疫不全症候群(エイズ)に伴う播種性マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)症	クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医工」、クラリスロマイシンDS10%小児用「日医工」	無
クラリスロマイシン(200mg錠)	錠		クラリス、クラリシッド	非結核性抗酸菌症(マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)症を含む)ラベプラゾール(バリエット)との併用におけるヘリコバクター・ピロリ感染症	クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	無
クレンブテロール塩酸塩	錠		スピロベント	腹圧性尿失禁(後発品ではアルバプロール錠にあり)	(該当品なし)	
シクロスボリン	Cp		ネオオラル	心移植・肺移植・脾移植における拒絶反応の抑制、全身型重症筋無力症、アトピー性皮膚炎	シクボラルCp10・25・50	無
シプロフロキサシン	注		シプロキサシ注	[用法]著しい水分摂取制限がかかっている場合等、水分負荷がかけられない場合には希釈せずに投与することができるが、その際はできるだけ太い静脈から投与することが望ましい	シプロフロキサシン点滴静注液200mg・300mg「日医工」	無
シロスタゾール	錠		ブレタール	脳梗塞(心原性脳塞栓症を除く)発症後の再発抑制	シロステート錠50・100	無
セチリジン塩酸塩	錠		ジルテック	[小児]アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒 [小児][用法]通常、7歳以上15歳未満の小児にはセチリジン塩酸塩として1回5mgを1日2回、朝食後及び就寝前に経口投与する。	セチリジン塩酸塩錠5mg「日医工」	無
セフテラム ピボキシル	細粒		トミロン細粒小児用10%	成人(嚥下困難等により錠剤の使用が困難な場合)	テラセフロン細粒100mg小児用	無
セフトリアキソンナトリウム	注用		ロセフィン	[小児][用法]1日20~60mg(力価)/kgを1回又は2回に分けて静脈内注射又は点滴静注する(1日1回)	セフィローム静注用0.5g、1.0g、セフトリアキソンナトリウム点滴用1gバッグ「NP」	有
テオフィリン徐放	顆粒		テオドールG20%	慢性気管支炎、肺気腫(スロービット顆粒にはある)	(該当品なし)	
テオフィリン徐放(50mg)	錠		テオドール錠50mg	慢性気管支炎、肺気腫(テオロング錠50mgにはある)	(該当品なし)	
トラニラスト	錠・細粒		リザベン	ケロイド、肥厚性瘢痕	トラニラストDS5%小児用「日医工」、トラニラストカプセル100mg「日医工」	有
ニコランジル	注用		シグマート	急性心不全(慢性心不全の急性増悪期を含む)	ニコランジル点滴静注用2mg・12mg・48mg「日医工」	無
(ニフレック)	液		ニフレック内用	バリウム注腸X線造影検査	オーベグ	無
パミドロン酸二ナトリウム	注用		アレディア	乳癌の溶骨性骨転移	(該当品なし)	

先発品と適応症の異なる後発品のチェックリスト

一般名(あ順)		分類	先発品名	備考欄(適応症・用法等)	日医工品名	
バンコマイシン塩酸塩	注用		塩酸バンコマイシン	バンコマイシンに感性的ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)による敗血症、肺炎、化膿性髄膜炎	バンマイシン点滴静注用0.5g	無
ピコスルファートナトリウム	液		ラキソベロン液	手術前における腸管内容物の排除(後発品にはある)	ペルベロン内用液0.75%	有
برانلカスト水和物	錠・Cp		オノン	アレルギー性鼻炎	برانلカストCp「日医工」	無
フロセミド(20mg)	注		ラシックス注20mg	急性または慢性腎不全による乏尿(20mg注ではロープストン注のみにある)	ロープストン注20mg	有
ヘパリン類似物質	ゲル		ヒルドイドゲル	痔核、「血栓性静脈炎(痔核を含む)」(後発品にはある=ピーソフテン、ホソイドン、エアリ-ト)	ピーソフテンゲル	有
ベラパミル塩酸塩	錠		ワソラン	頻脈性不整脈	(該当品なし)	
ベラプロストナトリウム	錠		ドルナー、プロサイリン	原発性肺高血圧症	プロルナー錠20μg・40μg	無
メサラジン	錠		ペンタサ	[用法]潰瘍性大腸炎の活動期には、必要に応じて1日4,000mgを2回に分けて投与することができる [小児][用法]小児にはメサラジンとして1日30~60mg/kgを3回に分けて食後経口投与する	メサラジン錠250mg「日医工」	無
メロペネム水和物	注用		メロペン	化膿性髄膜炎(髄膜炎菌) [小児][用法]小児にはメロペネムとして1日30~60mg(力価)/kgを3回に分割し30分以上かけて点滴静注する	メロペネム点滴用バイアル 0.25g・0.5g「日医工」	無
ランソプラゾール(OD錠、Cp)	15mg		タケプロン	非びらん性胃食道逆流症、胃潰瘍又は十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助	ランソラールカプセル15	有
	30mg			胃潰瘍又は十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助	ランソラールカプセル30	有