

本資料は“先発品と後発品で適応症の異なる薬剤”を「医薬品医療機器情報提供ホームページ」などを参考にして日医工MPSがまとめました。適応症名は一部省略しているものもあります。また調査漏れ、資料作成後の承認状況等により記載情報が変更になっている可能性もあります。本資料はチェック用の参考資料としてご利用いただき、必ず最新の添付文書等でご確認ください。
[作成日：2010年5月28日]

分類 :先発品のみ備考欄の「適応症」を有している医薬品	日医工品には適応症が有るもの
分類 :先発品と一部の後発品が備考欄の「適応症」を有している医薬品	日医工品には適応症が無いもの
分類 :一部の後発品には備考欄の「適応症」を有しているが、先発品にはない医薬品	日医工には該当品が無いもの

一般名(あ順)	液	分類	先発品名	備考欄(適応症・用法等)	日医工品名	
アクリノール水和物	液		アクリノール消毒用液0.1% 「マルイシ」	口腔領域における化膿局所の消毒	アクリノール液0.1%「ORY」	無
アシクロビル	ゼリー		ゾビラックス(錠400)	単純疱疹、骨髄移植における単純ヘルペスウイルス感染症(単純疱疹)の発症抑制 (ゼリー剤)	アシビル内服ゼリー800mg	無
アスピリン	末		(アスピリン「ホエイ」)	川崎病(川崎病による心血管後遺症を含む)	アスピリン・OY	無
アモキシシリン	Cp		サワシリン、パセトシン	「胃潰瘍・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症」のうち ・アモキシシリン水和物、クラリスロマイシン及びラベプラゾールナトリウム併用の場合	アモキシシリンカプセル250mg「 日医工」、「タツミ」	無
アルガトロバン	注		スロンノン、ノバスタン	ヘパリン起因性血小板減少症(HIT) 型における血栓症の発症抑制	アルガロン注10mg	無
アルプロスタジル	注		パルクス、リブル	経上腸間膜動脈性門脈造影における造影能の改善	(該当品なし)	
イオバミドール(注のみ)	注		イオバミロン	用法のただし書、「なお、胸・腹部を高速らせんコンピューター断層撮影で撮像する場合は、撮影対象部位により静脈内投与速度を調節する。ただし、投与量は肝臓領域を除く胸・腹部の場合は100mLまでとするが、肝臓領域の場合は150mLまで投与することができる。」(後発品ではイオバロミンにあり)	(該当品なし)	
イトラコナゾール	Cp		イトリゾール	爪カンジダ症、カンジダ性爪囲爪炎	トラコナ錠50mg、100mg	有
イミダプリル塩酸塩	錠		タナトリル	1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg・ 5mg「日医工」、「TCK」	無
過テクネチウム酸ナトリウム			ウルトラテクネカウ	医療機器「テクネガス発生装置」との組合せ使用による局所肺換気機能の検査	(該当品なし)	
カルベジロール	錠		アーチスト	「虚血性心疾患または拡張型心筋症に基づく慢性心不全」でACE阻害薬、利尿剤、ジギタリス等の基礎治療を受けている患者(虚血性心疾患または拡張型心筋症に基づく慢性心不全)	カルベジロール錠10「タツミ」	無
グラニセトロン塩酸塩	注		カイトリル	造血幹細胞移植前処置時の放射線全身照射(TBI)に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)	グラニセトロン静注液1mg・3mg 「日医工」、グラニセトロン点滴 静注液3mg バック「日医工」	無
クラリスロマイシン(200mg錠)	錠		クラリス、クラリシッド	ラベプラゾール(パリエット)との併用におけるヘリコバクター・ピロリ感染症	クラリスロマイシン錠200mg「日 医工」	無
ケトプロフェン	テープ		モーラス	関節リウマチにおける関節局所の鎮痛	ケトプロフェンテープ20mg・ 40mg「日医工」	有
ゲムシタピン	注用		ジェムザール	膀胱癌、手術不能又は再発乳癌	(該当品なし)	
シクロスポリン	Cp		ネオオーラル	心移植・肺移植・臍移植における拒絶反応の抑制、アトピー性皮膚炎(既存治療で十分な効果が得られない患者)	シクボラールCp10・25・50	無

一般名(あ順)		分類	先発品名	備考欄(適応症・用法等)	日医工品名	
シロスタゾール	錠		ブレタール	脳梗塞(心原性脳塞栓症を除く)発症後の再発抑制	シロステート錠50・100	無
セチリジン塩酸塩	錠		ジルテック	[小児]アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒 [小児][用法]通常、7歳以上15歳未満の小児にはセチリジン塩酸塩として1回5mgを1日2回、朝食後及び就寝前に経口投与する。	セチリジン塩酸塩錠5mg「日医工」	無
セフジトレンピボキシル	細粒		メイアクトMS小児用細粒10%	成人(嚥下困難等により錠剤の使用が困難な場合)	セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「日医工」	有
セフトラムピボキシル	細粒		トミロン細粒小児用10%	成人(嚥下困難等により錠剤の使用が困難な場合)	テラセフロン細粒100mg小児用	有
セフトリアキソンナトリウム	注用		ロセフィン	[小児][用法]1日20～60mg(力価)/kgを1回又は2回に分けて静脈内注射又は点滴静注する(1日1回)	セフィローム静注用0.5g、1.0g、セフトリアキソンナトリウム点滴用1gバッグ「NP」	有
トスフロキサシントシル酸塩水和物	錠		オゼックス、トスキサシン	(適応菌種)肺炎球菌の但し書き「(ペニシリン耐性肺炎球菌を含む)」	トスフロキサシントシル酸塩錠75mg・150mg「日医工」	有
ナトリウム・カリウム配合剤	散		ニフレック配合内用剤	バリウム注腸X線造影検査の前処置における腸管内容物の排除	オーベグ	無
テオフィリン徐放	顆粒		テオドールG20%	慢性気管支炎、肺気腫(スロービット顆粒にはある)	(該当品なし)	
テオフィリン徐放(50mg)	錠		テオドール錠50mg	慢性気管支炎、肺気腫(テオロング錠50mgにはある)	(該当品なし)	
トラニラスト	Cp・細粒		リザベン	ケロイド、肥厚性癬痕(マゴチラスト細粒にない)	(該当品なし)	
ニコランジル	注用		シグマート	急性心不全(慢性心不全の急性増悪期を含む)	ニコランジル点滴静注用2mg・12mg・48mg「日医工」	無
(ニフレック)	散		ニフレック内用	バリウム注腸X線造影検査の前処置における腸管内容物の排除	オーベグ	無
バンコマイシン塩酸塩	注用		塩酸バンコマイシン	バンコマイシンに感性的ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)による敗血症、肺炎、化膿性髄膜炎	バンマイシン点滴静注用0.5g塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「TX」	無
フロセミド(20mg)	注		ラシックス注20mg	急性または慢性腎不全による乏尿(20mg注ではロープストン注のみにある)	ロープストン注20mg	有
プロピベリン	錠		バップフォー	過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁	ウロナベリン錠10・20	有
ヘパリン類似物質	ゲル		ヒルドイドゲル	血栓性静脈炎の但し書き「(痔核を含む)」(後発品にはある = ビーソフテン、ホソイドン、エアリ-ト)	ビーソフテングル0.3%	有
ベラパミル塩酸塩	錠		ワソラン	頻脈性不整脈(心房細動・粗動、発作性上室性頻拍)	(該当品なし)	
ベラプロストナトリウム	錠		ドルナー、プロサイリン	原発性肺高血圧症	プロルナー錠20μg・40μg	有
ボグリボース	錠・OD		ベイスン	耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制(ただし、食事療法・運動療法を十分に行っても改善されない場合に限る)	ボグリボース錠0.2mg「日医工」、ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」	無
メサラジン	錠		ペンタサ	[用法]潰瘍性大腸炎の活動期には、必要に応じて1日4,000mgを2回に分けて投与することができる	メサラジン錠250mg「日医工」	有
メロベネム水和物	注用		メロベン	化膿性髄膜炎(髄膜炎菌)、発熱性好中球減少症	メロベネム点滴静注用パイアル0.25g・0.5g・0.5gバッグ「日医工」	無