

本資料は“先発品と後発品で適応症の異なる薬剤”を「医薬品医療機器情報提供ホームページ」などを参考にして日医工MPSがまとめました。  
 本資料は早見表(参考資料)として利用しやすいように適応症名や製品名などを一部簡略化しています。また調査漏れ、資料作成後の承認状況等により記載情報が変更になっている可能性もありますので、必ず最新の添付文書等でご確認ください。  
**[作成日:2011年1月14日]**

<b>分類</b> :先発品のみ備考欄の「適応症」を有している医薬品	日医工品には適応症が有るもの
<b>分類</b> :先発品と一部の後発品が備考欄の「適応症」を有している医薬品	日医工品には適応症が無いもの
<b>分類</b> :一部の後発品には備考欄の「適応症」を有しているが、先発品にはない医薬品	日医工には該当品が無いもの

一般名(あ順)	液	分類	先発品名	備考欄(適応症・用法等)	日医工品名		
アクリノール水和物	液		アクリノール消毒用液0.1% 「マルイシ」	口腔領域における化膿局所の消毒	アクリノール液0.1%「ORY」	有	
アミオダロン塩酸塩	錠		アンカロン	心不全(低心機能)に伴う心房細動			
アモキシシリン	細粒		アモリン	胃・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症のクラリスロマイシン、オメプラゾールとの3剤併用 除菌治療不成功の場合の処置(二次除菌療法) 胃MALTリンパ腫・特発性血小板減少性紫斑病・早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症			
			サワシリン、パセトシ	胃・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症のクラリスロマイシン、ラベプラゾールナトリウムとの3剤併用			
	錠・OD		アモリン			アモキシシリンカプセル250mg「 タツミ」	有
			サワシリン、パセトシ				
アルガトロバン	注		スロンノン、ノバスタン	ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)型における血栓症の発症抑制	アルガロン注10mg	無	
アルプロスタジル	注		パルクス、リブル	経上腸間膜動脈性門脈造影における造影能の改善			
イトラコナゾール	Cp		イトリゾール	爪カンジダ症、カンジダ性爪囲爪炎	トラコナ錠50mg、100mg	有	
イミダプリル塩酸塩	錠		タナトリル	1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg・ 5mg「日医工」、「TCK」	無	
ウルソデオキシコール酸	錠		ウルソ	・原発性胆汁性肝硬変における肝機能の改善、・C型慢性肝炎における肝機能の改善 (レプター錠50・100(日本ジェネリック)に無し)	ウルソデオキシコール酸錠 100mg「ZE」	有	
過テクネチウム酸ナトリウム			ウルトラテクネカウ	医療機器「テクネガス発生装置」との組合せ使用による局所肺換気機能の検査			
カルベジロール	錠		アーチスト	「虚血性心疾患または拡張型心筋症に基づく慢性心不全」でACE阻害薬、利尿剤、ジギタリス等の基礎治療を受けている患者(虚血性心疾患または拡張型心筋症に基づく慢性心不全)	カルベジロール錠10「タツミ」	無	
グラニセトロン塩酸塩	注		カイトリル	造血幹細胞移植前処置時の放射線全身照射(TBI)に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)	グラニセトロン静注液1mg・3mg 「日医工」、グラニセトロン点滴 静注液3mg「バック」日医工	無	
クラリスロマイシン(200mg錠)	錠		クラリス、クラリシッド	ラベプラゾール(パリエット)との併用におけるヘリコバクター・ピロリ感染症	クラリスロマイシン錠200mg「日 医工」	無	
グリメピリド	錠		アマリール	先発品は「2型糖尿病」、後発品は「インスリン非依存型糖尿病」 両者の意味はほぼ同じ 先発品は「…1日0.5~1mgより開始し…」、後発品は「…1日1mgより開始し…」	グリメピリド錠1mg・3mg「日医 工」	無	

一般名(あ順)		分類	先発品名	備考欄(適応症・用法等)	日医工品名	
ケトプロフェン	テープ		モーラス	関節リウマチにおける関節局所の鎮痛(「ラクール」に無し)	ケトプロフェンテープ20mg・40mg「日医工」、ライラテープ20mg・40mg	有
ゲムシタピン	注用		ジェムザール	膀胱癌		
シクロスポリン	Cp		ネオオラル	心移植・肺移植・脾移植における拒絶反応の抑制、アトピー性皮膚炎(既存治療で十分な効果が得られない患者)	シクボラルCp10・25・50	無
シロスタゾール	錠		ブレタル	脳梗塞(心原性脳塞栓症を除く)発症後の再発抑制(コートリズム錠50・100、プレトモール錠100に無し)	シロステート錠50・100	有
セチリジン塩酸塩	錠		ジルテック	{小児}アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒 {小児}[用法]通常、7歳以上15歳未満の小児にはセチリジン塩酸塩として1回5mgを1日2回、朝食後及び就寝前に経口投与する。	セチリジン塩酸塩錠5mg「日医工」	無
セフテラムピボキシル	細粒		トミロン細粒小児用10%	成人(嚥下困難等により錠剤の使用が困難な場合)(セトラート細粒小児用10%(沢井)に無し)	テラセフロン細粒100mg小児用	有
セフトリアキソンナトリウム	注用		ロセフィン	{小児}[用法]1日20~60mg(力価)/kgを1回又は2回に分けて静脈内注射又は点滴静注する(1日1回) (セフトリアキソンナトリウム静注用1g「TX」に無し)	セフィローム静注用0.5g・1.0g、セフトリアキソンナトリウム点滴用1gバッグ「NP」	有
ナトリウム・カリウム配合剤(ニフレック)	散		ニフレック配合内用剤	バリウム注腸X線造影検査の前処置における腸管内容物の排除	オーベグ	無
テオフィリン徐放	顆粒		テオドールG20%	慢性気管支炎、肺気腫(スロービット顆粒にはある)		
テオフィリン徐放(50mg)	錠		テオドール錠50mg	慢性気管支炎、肺気腫(テオロング錠50mgにはある)		
ニコランジル	注用		シグマート	急性心不全(慢性心不全の急性増悪期を含む)	ニコランジル点滴静注用12mg・48mg「日医工」	無
バンコマイシン塩酸塩	注用		塩酸バンコマイシン	バンコマイシンに感性的ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)による敗血症、肺炎、化膿性髄膜炎	バンマイシン点滴静注用0.5g	無
フルボキサミンマレイン酸塩	錠		ルボックス・デプロメール	社会不安障害	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg・50mg・75mg「日医工」	有
フロセמיד(20mg)	注		ラシックス注20mg	急性または慢性腎不全による乏尿(20mg注ではロープストン注のみにある)	ロープストン注20mg	有
ヘパリン類似物質	ゲル		ヒルドイドゲル0.3%	血栓性静脈炎の但し書き(痔核を含む)(後発品にはある=ビーソフテン、ホソイドン、エアリ-ト)	ビーソフテングル0.3%	有
ベラプロストナトリウム	錠		ドルナー、プロサイリン	原発性肺高血圧症	プロルナー錠20μg・40μg	有
ボグリボース	錠・OD		ベイスン	耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制(ただし、食事療法・運動療法を十分に行っても改善されない場合に限る)	ボグリボース錠0.2mg「日医工」、ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」	無
ミダゾラム	注		ドルミカム	「麻酔前投薬」と「集中治療における人工呼吸中の鎮静」の小児用法		
メロベネム水和物	注用		メロベン	化膿性髄膜炎(髄膜炎菌)、発熱性好中球減少症	メロベネム点滴静注用バイアル0.25g・0.5g・0.5g/バッグ「日医工」	無

先発品と適応症の異なる後発品のチェックリスト

一般名(あ順)		分類	先発品名	備考欄(適応症・用法等)	日医工品名	
ラベプラゾールナトリウム	錠		パリエット10mg	ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助(胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃)、「逆流性食道炎におけるプロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な場合」の用法 上記に追加「非びらん性胃食道逆流症」(ジェネリック6銘柄が該当)	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	無
			パリエット20mg	「逆流性食道炎におけるプロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な場合」の用法	ラベプラゾールナトリウム錠20mg「日医工」	無
ランソプラゾール	Cp		タケプロン15mgCp	低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制、非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制	ランソールカプセル15	無
			タケプロン15mgOD錠	低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制、非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制	ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」	無
	OD錠	タケプロン30mgOD錠	ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助(胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃)	ランソプラゾールOD錠30mg「日医工」	有	